



Kostenindicatie controle prothese en implantaten

Een goede hygiëne van uw mond en uw kunstgebit is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. Implantaten zijn erg gevoelig voor tandplak, ontsteking van het tandvlees en tandsteen. Wanneer dit geen goede zorg krijgt, kan een implantaat verloren gaan. Een goede instructie voor de juiste mondhygiëne is van groot belang, zodat we er samen voor zorgen dat de implantaten levenslang mee gaan. Tevens is naast een goede instructie ook periodiek een implantaatcontrole erg belangrijk. Gekeken wordt of de implantaten nog goed vastzitten, of het tandvlees gezond is en of de mondhygiëne in orde is.

Ongeveer 6 weken na het plaatsen van de prothese op implantaten volgt de eerste controle. Er wordt ook een controle röntgenfoto (OPT) gemaakt, welke onderdeel is van de 0-meting. Deze 0-meting zal de basisvergelijking vormen voor alle controles en röntgenfoto's in de toekomst. Deze controle en 0-meting zijn de afsluiting van de behandeling en worden de laatste puntjes op de i gezet.

6 maanden na plaatsing van de prothese op implantaten volgt de eerste controle, deze controles vallen *niet* meer onder de machtiging. 1 jaar na plaatsing volgt de tweede controle. Tijdens deze controle maken we ook een röntgenfoto (OPG), die vergeleken wordt met de 0-meting verwijderen we indien nodig het tandsteen en krijgt de patiënt eventueel nog nadere instructie omtrent het reinigen van de prothese en steg/drukknoppen.

De codes die we declareren bij een controle op implantaten:

- C-codes (controles en diagnostiek)
- X-codes (röntgenfoto wordt indien nodig gemaakt)
- M-codes (tandsteen verwijderen en instructie)

U kunt in uw verzekeringspolis nakijken of u voor deze codes in aanmerking komt voor een eventuele vergoeding.