



Het trekken van tanden en/of kiezen in de boven en onderkaak en het plaatsen van een immediaatprothese bij de kaakchirurg onder volledige narcose.

Indien u bent verwezen naar de kaakchirurg voor het laten trekken van uw laatste tanden en kiezen in de boven- en onderkaak, en het plaatsen van de immediaatprothese onder volledige narcose, is het belangrijk te weten dat dit gemaakte behandelplan niet zomaar kan worden gewijzigd.

Indien er in de boven- en onderkaak tegelijkertijd tanden en kiezen moeten worden getrokken kan dit alleen maar onder volledige narcose. De prothese die van tevoren gemaakt is en wordt geplaatst is zodanig gemaakt dat er een optimaal contact is tussen de kiezen van de bovenkaak en de kiezen van de onderkaak.

Als besloten wordt om het trekken achteraf toch onder lokale verdoving te laten plaatsvinden kunnen de boven- en onderprothese niet gelijktijdig worden geplaatst omdat het onder lokale verdoving niet mogelijk is alle delen van de boven- en onderkaak tegelijkertijd te verdoven. Er wordt dan gekozen of de elementen uit de bovenkaak, of de elementen uit de onderkaak te trekken. Het probleem is dan dat de boven- of onderprothese niet aansluit op de nog resterende eigen tanden en kiezen in de tegenovergelegen kaak. Dit probleem is vaak niet te verhelpen en kun je in die situatie niet kauwen tot het moment dat de resterende tanden in de tegenovergelegen kaak zijn getrokken en die prothese ook is geplaatst.

Als het gaat om een prothese die van tevoren gemaakt is voor alleen de boven of onderkaak is dit geen enkel probleem omdat die wel is gemaakt op de achterblijvende eigen tanden en kiezen in de tegenover gelegen kaak.

Onder lokale verdoving zijn de volgende mogelijkheden omtrent het trekken van tanden en/of kiezen in één behandeling:

- Alle resterende *tanden en kiezen* in alleen de bovenkaak.
- Alle resterende *tanden en kiezen* in alleen de onderkaak.
- Alle resterende *tanden* in boven- en onderkaak.

Als het trekken onder lokale verdoving gaat plaats vinden, wordt dit in fasen gedaan omdat niet alle delen van de kaken gelijktijdig kunnen worden verdoofd:

- In de eerste behandeling worden alle resterende kiezen getrokken in de bovenkaak
- In de tweede behandeling worden de resterende kiezen getrokken in de onderkaak
- Dan wordt de immediaatprothese vervaardigd, terwijl de tanden van de boven en onderkaak er nog in staan.
- Als het kunstgebit klaar is worden de tanden in boven- en onderkaak getrokken en wordt de prothese direct over de wonden heen geplaatst.

Dus als het voorgenomen behandelplan om alle resterende tanden en kiezen te laten trekken onder narcose verandert dient dit eerst te worden besproken met de kaakchirurg en de tandprotheticus.